EUROPEAN ADVISORY BOARD ON CAT DISEASES
ABCD

Postępowanie przy kaliciwirozie w skupisku kotów

NARZĘDZIE ABCD

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla lekarzy odpowiedzialnych za zdrowie i dobrostan kotów w bytujących skupiskach.
Są to tylko zalecenia, pomyślane jako stymulacja do dyskusji z klientami nad całościowym programem zdrowotnym.

Edukacja i oczekiwania

Zwalczanie zależy od sytuacji uwzględniając:

1. Demografię danej populacji

- zakres wieku kotów
- ich status reprodukcyjny
- higienę
  - kontakt z innymi populacjami kotów
  - inne mozliwe źródła zakażeń
  - jak rygorystyczne są środki ograniczania ryzyka
- liczebność grupy
- rotacje osobników

2. Rodzaj skupiska

- Klinika
- Schronisko
- Hodowla
- Hotel
- Dom prywatny

© Alan Radford

Im liczniejsza grupa i im intensywniejsze kontakty kotów ze światem zewnętrznym, tym większe ryzyko, że znajdą się w niej nosiciele kaliciwirusa (FCV).

Zdrowi nosiciele

- Koty które wyzdrowiały z kaliciwirozy wydalają wirus, niektóre latami, co podtrzymuje krążenie wirusa w tym skupisku.
- Im liczniejsza grupa i im intensywniejsze kontakty kotów ze światem zewnętrznym, tym większe ryzyko, że znajdą się w niej nosiciele kaliciwirusa.
- Przy braku dowodów że jest inaczej, należy przyjąć, że duże i średniej wielkości grupy kotów mają nosicieli.

Szczepienie

- Szczepienie łagodzi przebieg przyszłej kaliciwirozy, ale może nie być w stanie całkowicie jej zapobiec.
- Nie chroni ono ani nie leczy przewlekłego zapalenia dziąseł i takie koty zwykle są długotrwałym źródłem zakażenia.
- Szczepione koty także mogą stać się nosicielami.

Chore koty

- Wiele zarazków poza kaliciwirusem atakuje drogi oddechowe kotów, m.in. herpeswirus kotów i *Bordetella bronchiseptica*.
- Objawy są podobne, ale mogą sugerować któryś z nich.
- Jednak tylko laboratoryjnie można definitywnie określić te zarazki, co zwiększy szanse na skuteczne zwalczanie.
- Wiek w którym koty chorują może sugerować lukę w odporności, co może wskazywać na konieczność zmiany systemu szczepień zasadniczych.

Zdrowie

- W populacjach o dużej rotacji zwierząt z bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami ze środowiskiem zewnętrznym trzeba się pogodzić z pewną niewielką liczbą łagodnych przypadków kaliciwirozy.

EUROPEAN ADVISORY BOARD ON CAT DISEASES

ABCD

Narzędzie ABCD do oceny zwalczania kaliciwirozy

Poniższy system punktacji może być użyty do omówienia z właścicielem sytuacji zdrowotnej i możliwości zwalczania kaliciwirozy oraz do wyłonienia aspektów do poprawy. Staraj się zwiększać punktację i z czasem przechodzić z poziomu zwalczania 1 do 3, by ograniczać podatność na zachorowania, zwłaszcza gdy ich liczba jest niezadowalająca.

Punktacja za każde kółko
0 = brak
1 = pewne próby
2 = znaczne wysiłki
3 = całkiem spełnione

Sprawdzaj czy wprowadzane zmiany pomagają, czy utrudniają zwalczanie

Zalecane użycie narzędzia ABCD do oceny zwalczania kaliciwirozy

- Do dyskusji z właścicielem/zarządcą.
- Do identyfikacji obszarów dobrych praktyk...i dziedzin, gdzie zwalczanie mogłoby być poprawione.
- **UWAGA**: ABCD nie jest w stanie zdalnie sprecyzować docelowej punktacji. Jednakże....
  - *Wszystkie skupiska kotów powinny mieć stosunkowo dużo punktów z poziomu 1, nawet przy braku zachorowań.*
  - *Większe skupiska powinny mieć więcej punktów z poziomów 2 i 3.*
  - *Skupiska z permanentnymi zachorowaniami powinny osiągnąć więcej punktów i dążyć do wejścia na wyższy poziom.*
- System punktacji (i dyskusja z niego wynikająca) może byc szczególnie przydatny:
  - *W przypadku wybuchu zachorowań.*
  - *Gdy liczba permanentnie występujących zachorowań zostanie uznana za zbyt dużą.*
  - *Jako element regularnych spotkań w celu poprawy zarządzania zdrowiem kotów.*
- Zaplanuj kroki, by zwiększyć punktację i zmierzać z obszaru czerwonego do zielonego.
- Gromadź wyniki kolejnych ocen i monitoruj jak sytuacja się zmienia.